

收

捐血人通訊地址如有變更，請即刻通知更正。

基於保障捐血人的健康、維護用血人的安全，請您仔細閱讀下列注意事項：

一、依據行政院衛生署規定，人類免疫缺乏病毒（愛滋病毒）的檢驗結果一律不予告知，陽性個案將由衛生署列管追蹤。

二、檢驗結果為「陽性」或「偏高」者，請依說明事項，前往任一捐血地點抽血複檢。尚未恢復正常之前，請暫勿捐血，請參考本會網站（www.blood.org.tw）或各捐血地點放置之相關衛教說明。

三、病毒核酸（DNA 或 RNA）檢驗是一種敏感度較高的檢驗方法，可以偵測體內極低量的 B 型肝炎病毒、C 型肝炎病毒以及愛滋病毒。捐血中心在有限的經費下，僅對部分捐血者進行本項檢驗。

四、為確保輸血患者之安全，捐血中心採用敏感度較高的檢驗試劑與方法。檢驗結果若呈陽性反應，有可能是受到感染，也有可能是其他干擾因素造成的「假陽性反應」。您的檢驗報告如有任何異常項目，建議您前往醫院進行相關檢查，洽詢專科醫師的專業意見。

捐血日期	中心卡號	血袋號碼	累計捐血次數	列印日期	

捐血檢驗：本報告僅供捐血人自行參閱，不適於其他用途。

檢 驗 項 目		結 果	說 明 事 項
血 壓	收縮壓		捐血合格範圍 90-160 mmHg
	舒張壓		捐血合格範圍 50- 95 mmHg
血型（ ABO 及 Rh ）			ABO 和 Rh 均為人體之血型系統，係由親代遺傳基因所決定。
血清轉胺酶（ ALT ）			結果為「 偏高 」者：請於 1 個月後抽血複檢。
血清反應素（ STS ）			結果為「 陽性 」者：請於 1 個月後抽血複檢。
B 型 肝炎病毒	表面抗原 （ HBsAg ）		結果為「 無法確認 」或「 陽性 」者：請於 6 個月後抽血複檢。
C 型 肝炎病毒	病毒抗體 （ Anti-HCV ）		結果為「 無法確認 」或「 陽性 」者：請於 6 個月後抽血複檢。
人類 嗜T淋巴球 病毒	病毒抗體 （ Anti-HTLV ）		結果為「 陽性 」者：請參考西方墨點試驗。
	西方墨點 （ western blot ）		1. 結果為「 陰性 」者：請於 3 個月後抽血複檢。 2. 結果為「 無法確認 」者：請於 6 個月後抽血複檢。 3. 結果為「 陽性 」者：請勿再捐血，並請至醫院進一步檢查。
膽固醇（ Cholesterol ）			1. 當您於 3 年內持續捐血，每隔 6 個月將為您增加此 2 項檢查。 2. 血液中膽固醇正常值一般為 200 mg/dL 以下。 3. 血液中尿酸正常值於男性為 4.4-7.6 mg/dL、女性為 2.3-6.6 mg/dL。
尿 酸（ Uric Acid ）			

親愛的捐血朋友，謝謝您參與捐血活動。

敬 啟